

גידול אמריליס ציביסטר כפרח קטיפ.

חוקרים שותפים:

עירית דורין, ליאנה גנות – מוי"פ דרום.
יair נישרי גבעון לוריא – שה"מ פרחים, משרד החקלאות.
דורית סנדר – מה' לפרחים, מינהל המחקר החקלאי.

מבוא:

האמריליס איננו גידול חדש בארץ. מזה שנים הוא מגודל במשקים חקלאיים בהיקפים גדולים במידה, אולם עד היום עיקר השיווק התמקד במכירת חומר ריבוי. בغالל עלות גבולה של החובל האוירית לחו"ל, לא שוקו כמעט פרחים של אמריליס אלא בעיקר בצלים. בשנים האחרונות עם התפתחות התובלה הימית הועלו הרעיון לבחון את האפשרות לגידול אמריליס כפרח קטיפ. מבדיות שנערכו בבורסות הפרחים התברר שניתן לשוק פרחים במחירים סבירים מנובמבר עד מאי. בחודש דצמבר בתקופת החגיגים כריסמס וחג המולד יש ביקוש גדול לפרח זה וגם המחרירים בתקופה זו טובים. בניסוי שנערך התברר שפרחים שהובל בתובלה ימית הגיעו לאירועה באיכות זהה לאלו שבתובלה אוירית. בשנים האחרונות נבחנה במסגרת האינטראודקציה קבוצה חדשה של זני אמריליס הנקראות ציביסטר. בניית הפרח בקבוצה זו שונה שונה משל זני האמריליס הקלאסיים, עלי הכותרת מחודדים בקצה ויוצרים מעין צורת כוכב (תמונה 2+1). כמו כן גבעולי הפריחה דקים וארוכים יחסית. בתרומות אשר נערכה במסגרת תערוכת הפרחים الأخيرة בהולנד זכה האמריליס ציביסטר במקום הראשון.

שיטת וחומרים:

במסגרת התמצפית נבחנו 3 זני אמריליס ציביסטר : שני זנים אדומיים : טngo ולה פז וזון אחד יירוק עם שליליים אדומיים הנקרاء : אמרלד. הבצלים של כל אחד מהזנים חולקו ל- 6 קבוצות גודל ע"פ הקוטר : 8-16, 16-20, 20-24, 24-30, 30-36 ו- +36. הבצלים הוכנסו למקרר בטמפרטורה של 13 מעלות סלזיוס למשך חודשים לאחר מכן ונשתלו ב- 15/9/05 בקרקע בחממה בתנאי יום טבעי. נערך מעקב אחר מועד הפריחה יבול הפרחים ואיכותם בכל אחד מהזנים לפי גודל הבצל. כמו כן לאחר הוצאה הבצלים מהקרקע נאספו נתוניים לגבי ריבוי הבצלים גם כן לפי הזנים וגודל הבצלים.

תוצאות:

מועד הפריחה:

פריחת הגל הראשון החלה בחודש לאחר השטילה אמצע אוקטובר ונמשכה עד סוף נובמבר.
פריחת הגל השני החלה באמצע אפריל ונמשכה עד אמצע يول.

יבול:

בגל הראשון ככל שהבצלים היו גדולים יותר כך יבול הפרחים היה גבוה יותר (תרשים 1).
בצלים בגודל +36 הניבו 4-5 פרחים לבצל, בצלים בגודל 30-36 הניבו 2-2.5 פרחים לבצל, בצלים בגודל 30-24 הניבו 1.5-2.2 פרחים לבצל ובצלים בגודל 20-24 הניבו

8-0.7 פרחים לבצל. בצלים קטנים מגודל 20 כמעט ולא פרחו.
בגל השני לא היו הבדלים ברורים ביבול הפרחים בין קבוצות הגודל השונות והזנים השונים (תרשים 2). רב הבצלים מעל גודל 16 הניבו 0.3-1.5 פרחים לבצל חוץ מהזן אמרלד בקבוצת גודל 36+ והזן טngo בקבוצת גודל 20-16 שהניבו בגל השני 2 פרחים לבצל. בgal השני ננסה לניבת קבוצת גודל 20-16 שלא פרחה בגל הראשון. בקבוצת גודל 16-8 כמעט לא הייתה פריחה, ככלומר היו בה מספר פרחים בודדים.

סח"כ בשני גלי הפריחה יחד בולטות מוגמה של עלייה ביבול הפרחים עם העלייה בגודל הבצל (תרשים 3). בצלים של הזן אמרלד בגודל 36+ הניבו בשני הגלים יחד את יבול הפרחים הגבוהה ביותר 6 פרחים לבצל, אולם בקבוצות הגודל האחרות יבול הפרחים של הזן אמרלד היה דווקא נמוך בהשוואה לזרנים לה פז וטngo. יש לציין שאפיילו בצלים בקבוצת גודל 20-16 אשר נחשבת לפחותנה אמריליס הניבה יבול של 2-6 פרחים רובה ככלו בגל השני.

אורך פרח:

לא נצפו הבדלים משמעותיים באורך הפרח בגל הראשון בין הזרנים וקבוצות הגודל מעל גודל 16 (תרשים 4). אורך הפרחים בקבוצות אלה היה 55-64 ס"מ ואילו בקבוצת גודל 16-8 הפרחים היו קצרים יחסית רק 46 ס"מ. בגל השני הפרחים היו ארוכים בכ- 10 ס"מ בהשוואה לגל הראשון (תרשים 5). גם בגל השני לא ניכרו הבדלים גדולים באורך הפרחים בין הזרנים וגדלי הבצל השונים ואורך הפרחים היה 63-73 ס"מ.

משקל הפרח:

בגל הראשון, חוץ מבון אמרלד בגודל 36+ ניכרת מוגמה של ירידה במשקל הפרחים עם הירידה בגודל הבצלים (תרשים 6). ברוב המקרים פרחים ארוכים יותר שקלו יותר. אולם המוגמה של ירידה במשקל יחד עם הבדלים קטנים יחסית באורך, מצבעה על כך שהפרחים שהניבו הבצלים הקטנים היו כנראה בעלי גבול דק בהשוואה לפרחים שהניבו בצלים גדולים. משקל הבצלים מעל גודל 16 היה 60-60 גרם ואילו בקבוצת גודל 16-8 ירד משקל הבצלים ל- 30 גרם בלבד. בגל השני משקל הפרחים היה גבוה בכ- 25-20 גרם בהשוואה לגל הראשון (תרשים 7). תוספת המשקל קשורה בודאי לכך שהפרחים בגל השני היו ארוכים יותר. גם הגל השני ניכרה מוגמה של ירידה במשקל הפרח עם הירידה בגודל הבצל. פרחים שהניבו הבצלים גדולים 36+ היו במשקל כפול (113 גרם) מפרחים שהניבו בצלים קטנים 16-8 (54-68 גרם).

מספר פעמוניים:

מספר הפעמוניים בתפרחת בגל הראשון בצלים מעל גודל 16 לא השתנה משמעותית בין קבוצות הגודל באותו הזן, אולם נראה שבכל קבוצות הגודל לזרן אמרלד היה יתרון במספר הפעמוניים על פני שני הזרנים האחרים (תרשים 8). בזרן אמרלד מס' הפעמוניים היה 4.5-5.1 בזרן טngo 4.2 ובזרן פז 4-3.7. הבצלים הקטנים גודל 16-8 הניבו רק 2 פעמוניים בממוצע לתפרחת. בגל השני בצלים מעל גודל 20 הניבו 4-4.5 פעמוניים לתפרחת, בצלים בגודל 20-16 הניבו 4-3.3 פעמוניים ובצלים בגודל 16-8 הניבו 2-2.8 פעמוניים לתפרחת (תרשים 9).

ריבוי:

בשלושת הזרים ככל שהבצל המקורי היה גדול יותר (טור ימני בטבלה) כך הבצלים שנוצרו ממנו (שורה עליונה בטבלה) היו גדולים יותר ורבים יותר (טבלאות 1+2+3).

טבלה 1 : השפעת גודל הבצל המקורי על מספר הבצלים שנוצרו מבצל אחד בזן אמרלד

סה"כ	קטן מ-8	8-16	16-20	20-24	24-30	30-36	+36	
96	57	16	5	8	6	4	0	+36
9.3	3.8	3.8	0.5	0.1	0.4	0.7	0	30-36
6.9	3.7	2	0.3	0.1	0.7	0.2	0	24-30
8	4.3	2.3	0.3	0.3	0.7	0	0	20-24
6.9	3.5	2.3	0.4	0	0.6	0	0	16-20
4.8	2.6	1.9	0.2	0.1	0	0	0	8-16

טבלה 2 : השפעת גודל הבצל המקורי על מספר הבצלים שנוצרו מבצל אחד בזן פז

סה"כ	קטן מ-8	8-16	16-20	20-24	24-30	30-36	+36	
8	4.5	1	1.5	0	0	0	1	+36
7	4.1	1.8	0	0.2	0	0.8	0.2	30-36
8.5	5	2.5	0	0	0.2	0.7	0	24-30
8.9	5.9	1.9	0	0	0.1	1	0	20-24
17	14	1	1	0	1	0	0	16-20
7.2	4.8	1.1	0.7	0.5	0	0	0	8-16

טבלה 3 : השפעת גודל הבצל המקורי על מספר הבצלים שנוצרו מבצל אחד בזן טנגו

סה"כ	קטן מ-8	8-16	16-20	20-24	24-30	30-36	+36	
12.5	4.5	5.8	1	0.3	0	0.5	0.5	+36
12.7	7.4	4.1	0.3	0.1	0.1	0.8	0	30-36
13.6	9	2.1	0	0	0.7	0.2	0	24-30
11.1	7.7	2.4	0	0	1	0	0	20-24
6.8	4.8	0.5	0	0	1.5	0	0	16-20
3	1.9	0.3	0.4	0.4	0	0	0	8-16

בשלושת הזרים בצלים קטנים בגודל 16-8 לא הניבו בצלים בגודל פריחה (מעל גודל 24).

בזן אמרלד בצל בודד בגודל 36+ הניב 10 בצל בוגודל פריחה (מעל גודל 24) ועוד 86 בצלים קטנים יותר (טבלה 1). הצל הזה בהחלט היה יוצא דופן בכמות ובגודל הצללים שייצר. בצלים מגודל 36-16 הניבו 1.1-0.6 בצלים לבצל בגודל פריחה ועוד 6.3-8.1 בצלים קטנים. בצלים קטנים בגודל 16-8 לא הניבו בצלים בגודל פריחה אך הניבו 4.8 בצלים קטנים.

בזן לה פז בצלים מעלה גודל 16 הניבו 1.1-0.9 בצלים לבצל בגודל פריחה ועוד 7-16 בצלים קטנים (טבלה 2). בצלים קטנים בגודל 16-8 לא הניבו בצלים בגודל פריחה אך הניבו 7.1 בצלים קטנים. בזן טngo בצלים מעלה גודל 16 הניבו 0.8-1.5 בצלים לבצל בגודל פריחה ועוד 11.8-5.3 בצלים קטנים (טבלה 3). בצלים קטנים בגודל 16-8 לא הניבו בצלים בגודל פריחה אך הניבו 3 בצלים קטנים.

משקל בצלים :

לא היו הבדלים משמעותיים בין הזנים במשקל הצללים המומוץ, בקבוצת גודל נתונה (תרשים 10). משקל בצל הבת בגודל 36+ היה 712-751 גרם, בגודל 36-30 משקל הצללים היה 504-561 גרם, בגודל 30-24 משקל 333-347 גרם. בצלים בגודל 20-24 היו במשקל 165-184 גרם, בגודל 16-20 שקלו 95-110 גרם, בגודל 16-8 שקלו 28-33 גרם ובצלים קטנים מ- 8 שקלו 6-7 גרם במומוץ.

סיכום :


שלושת הזנים הניבו שני גלי פריחה: גל ראשון שפרח מאמצע אוקטובר עד סוף נובמבר וגל שני שפרח מאמצע אפריל עד אמצע يولאי. בצלים בגודל פריחה (מעל גודל 24) בשלושת הזנים הניבו יבול נאה, 2-3.8 פרחים בשני גלי הפריחה ובצל בודד מהזן אמרלד בגודל 36+ הניב 6 פרחים במהלך כל עונת הגידול. רב הפרחים בגל הראשון היה מעל אורך 60 ס"מ ובגל השני אורך הפרחים השתפר והגיע עד 73 ס"מ. לזר אמרלד היה יתרון על פני הזנים האחרים מבחינת מספר הפעמונים בתפרחת (4.4-5.1), אולם גם הזנים לה פז וטngo היו בסביבות 4 פעמוניים לתפרחת.

סח"כ הנתונים שהתקבלו בתצפית זו מצבעים על יבול ואיכות טובים בקבוצת זני הצייטיסטר. כמו כן קיימת התעניינות בשוקים לגבי קבוצת זנים זו. הבעיה היא שנוצר מרוחש של מספר חדשניים בין שני גלי הפריחה מדצמבר עד אמצע אפריל בו הצמחים אינם פרוחים. חדש דצמבר הוא מעוניין במיוחד כי הביקוש לפרחים אדומים בחג המולד וכריסמס הוא גבוה. על מנת ליצור רצף של פריחה בחודשים נובמבר עד מאי בהם המחרירים בבורשות סבירים ולהגיע לפריחה בחודש דצמבר לחג המולד וכריסמס בו המחרירים בד"כ טובים, יש לבחון בהמשך, טיפול המרצה שונים ומועדית שתילה שידחו את פריחת הגל הראשון.


תמונה 2+1 : אמריליס ציביסטר מהזנים לה פז וטngo




תרשים 1: השפעת הzon וגודל הבצל על יבול הפרחים לצמח בגל הראשון




תרשים 2: השפעת הזרן וגודל הבצל על יבול הפרחים לצמח בגל השני




תרשים 3: השפעת הזרן וגודל הבצל על יבול הפרחים לצמח בשני הגלים




תרשים 4: השפעת הגזן וגודל הבצל על אורך הפרח בಗל הראשון




תרשים 5: השפעת הגזן וגודל הבצל על אורך הפרח בגל השני




תרשים 6: השפעת הגזן וגודל הבצל על משקל הפרח בגל הראשון




תרשים 7: השפעת הגזן וגודל הבצל על משקל הפרח בגל השני



תרשים 8: השפעת הגזן וגודל הבצל על מספר הפעמוניים בתפרחת בgal
הראשון



תרשים 9: השפעת הגזן וגודל הבצל על מספר הפעמוניים בתפרחת gal
השני



תרשים 10: משקל בצל ממוצע בזנים השונים ובקבוצות גודל שונות

